

Kent u de richtlijnen?

Geef aan of deze stellingen juist of onjuist zijn:

1. Bij mensen met een *Radiologically Isolated Syndrome* bestaat er geen behandelindicatie voor het starten met een ziektemodulerend middel. Bespreek wel de voor- en nadelen van klinische en radiologische monitoring.

Welk van de volgende factoren geeft géén verhoogd risico op het ontwikkelen van MS:

- a) Groot aantal T2 laesies (> 9 laesies)
- b) Unieke oligoclonale banden
- c) Oudere leeftijd.

Antwoord: c: oudere leeftijd

Bron: zie richtlijn *Ziektemodulerende behandeling van Multiple Sclerose bij volwassenen, Radiologically Isolated Syndrome*.

https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/ziektmodulerende_behandeling_van_multiple_sclerose_bij_volwassenen

2. Bepaal de radiologische stabiliteit van een patiënt die gestart is met ziektemodulerende behandeling vanwege een eerste relaps door middel van een MRI-hersenen met contrast, 3-12 maanden na de start van behandeling.

Antwoord: juist

Bron: zie richtlijn *Ziektemodulerende behandeling van Multiple Sclerose bij volwassenen, Behandeling eerste relapse MS, Langetermijn behandeling*. Richtlijn 2020. In de eerste twee jaar na start behandeling, dient 3-12 maanden later een rebaseline MRI-hersenen met contrast verricht te worden en vervolgens minimaal één keer per jaar (zonder contrast). Na de eerste twee jaar na start behandeling wordt de frequentie van MRI-monitoring bepaald door het gebruikte ziektemodulerende middel. Verricht echter minimaal elke 5 jaar een MRI-hersenen. Een MRI-hersenen zonder contrast is daarbij in principe voldoende.

https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/ziektmodulerende_behandeling_van_multiple_sclerose_bij_volwassenen/behandeling_van_patienten_met_een_eerste_relapse_ms/langetermijn_behandeling_bij_eerste_relapse_ms.html

3. Bij secundair progressieve MS is er geen indicatie om te starten met een ziektemodulerend middel.

Antwoord: onjuist

Bron: zie richtlijn *Ziektemodulerende behandeling van Multiple Sclerose bij volwassenen, Behandeling secundair progressieve MS, Start ziektemodulerende middelen*. Richtlijn 2020. Bij actieve secundair progressieve MS is hiervoor een indicatie. Hieronder verstaan we:

- aanwezigheid van inflammatoire activiteit op grond van relaps
- nieuwe of groter wordende geïsoleerde T2 laesies op MRI verdacht voor demyelinisatie
- gadolium aankleurende laesies op MRI

https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/ziektmodulerende_behandeling_van_multiple_sclerose_bij_volwassenen/behandeling_van_patienten_met_secundair_progressieve_ms/start_ziektmodulerende_middelen_bij_secundair_progressieve_ms.html